

DIRECTRICES DE LA CDC PARA LAS VACUNAS CONTRA EL COVID-19

	Niños de 5 a 11 años	Niños & Adolescentes de 12 a 17 años	Adultos entre 18 y 49 años	Adultos mayores de 50 años
PFIZER				
1ª dosis	Sí	Sí	Sí	Sí
2ª dosis	Sí <ul style="list-style-type: none"> • 3 semanas después la 1ra dosis • Debe aplicarse la de Pfizer 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • 3 a 8 semanas después de la 1ra dosis • Debe aplicarse la de Pfizer 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • 3 a 8 semanas después de la 1ra dosis • Debe aplicarse la de Pfizer 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • 3 a 8 semanas después de la 1ra dosis • Debe aplicarse la de Pfizer
1ª vacuna de refuerzo	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 5 meses después de la 2a dosis • Debe aplicarse la de Pfizer pediátrica 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 5 meses después de la 2a dosis • Debe aplicarse la de Pfizer pediátrica 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 5 meses después de la 2a dosis • Puede ser Pfizer o Moderna 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 5 meses después de la 2a dosis • Puede ser Pfizer o Moderna
2ª vacuna de refuerzo	No	No	No	Sí (opcional) <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 4 meses después de la 1a vacuna de refuerzo • Puede ser Pfizer o Moderna
MODERNA				
1ª dosis	No	No	Sí	Sí
2ª dosis	No	No	Sí <ul style="list-style-type: none"> • 4 a 8 semanas después de la 1ra dosis • Debe aplicarse la vacuna de Moderna 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • De 3 a 8 semanas después de la 1ra dosis • Debe aplicarse la vacuna de Pfizer
1ª vacuna de refuerzo	No	No	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 5 meses después de la 2a dosis • Puede ser Pfizer o Moderna 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 5 meses después de la 2a dosis • Puede ser Pfizer o Moderna
2ª vacuna de refuerzo	No	No	No	Sí (opcional) <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 4 meses después de la primera vacuna de refuerzo • Puede ser Pfizer o Moderna

ACTUALIZADO EL 8 DE JUNIO DEL 2022 * 1 * WWW.NIHHC.COM

DIRECTRICES DE LA CDC PARA LAS VACUNAS COVID-19

	Niños de 5 a 11 años	Niños & Adolescentes de 12 a 17 años	Adultos entre 18 y 49 años	Adultos mayores de 50 años
JOHNSON & JOHNSON				
1.ª dosis	No	No	Sí	Sí
2.ª dosis	No	No	No	No
1.ª vacuna de refuerzo	No	No	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 2 meses después de la 1ra dosis • Debe ser Pfizer o Moderna 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Por lo menos 2 meses después de la 1ra dosis • Debe ser Pfizer o Moderna
2.ª vacuna de refuerzo	No	No	Sí* <ul style="list-style-type: none"> • *SOLO SI la 1ra vacuna de refuerzo fué también J&J • Por lo menos 4 meses después de la 1ra vacuna de refuerzo • Debe ser Pfizer o Moderna 	Sí <ul style="list-style-type: none"> • Se recomienda si la 1ra vacuna de refuerzo fué también de J&J • Opcional si la primera vacuna de refuerzo fué Pfizer o Moderna • Por lo menos 4 meses después de la 1ra vacuna de refuerzo

- Niños de 5 a 11 años de edad, adultos mayores de 65 años, personas inmunocomprometidas o cualquier persona que desee protección adicional debido a los altos niveles de transmisión en la comunidad deben recibir la 2a dosis 3 semanas después de la primera dosis (Pfizer) o 4 semanas después de la 1a dosis (Moderna, solo adultos)
- Consideren la 2a dosis (Pfizer o Moderna) 8 semanas después de la primera dosis las personas de 12 a 64 años, especialmente los hombres de 12 a 39 años de edad.

Personas Inmunocomprometidas

Todas las edades: Deben recibir la segunda dosis 3 semanas después de la 1ra dosis (Pfizer) o 4 semanas después de la 1ra dosis (Moderna, sólo adultos)

Niños de 5 a 11 años: Deben recibir la 3ra dosis de Pfizer, por lo menos 4 semanas después de la 2a dosis.

Preadolescentes, adolescentes y adultos: deben recibir la 3ra dosis de Pfizer (12+) o la 3ra dosis de Moderna (18+), por lo menos 4 semanas después de la segunda dosis;
 Debe recibir la 1ra vacuna de refuerzo (Pfizer 12+ o Moderna 18+), por lo menos 3 meses después de la 3ra dosis
 2a vacuna de refuerzo opcional (Pfizer 12+ o Moderna 18+), por lo menos 4 meses después de la 1ra vacuna de refuerzo.

Personas que tienen o han tenido recientemente COVID-19

- Esperar a recibir cualquier vacuna, incluida la vacuna contra el COVID-19, hasta que se recupere y termine su período de aislamiento.
- Si recientemente tuvo COVID-19, puede considerar retrasar su próxima vacuna de refuerzo por 3 meses contando a partir del día que iniciaron los síntomas, y si no presentó síntomas, desde la fecha que salió positivo para COVID-19.

Personas que fueron vacunadas fuera de los Estados Unidos

Vacunas COVID-19 Aceptadas :

Vacunas aprobadas o autorizadas por la Administración de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos (FDA):

- Jansen de Johnson & Johnson
- Moderna
- Pfizer-BioNTech

Vacunas listadas para uso de emergencia por la Organización Mundial de la Salud:

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| • Jansen de Johnson & Johnson | • Covishield |
| • Moderna | • BIBP/Sinopharm |
| • Pfizer-BioNTech | • Sinovac |
| • AstraZeneca | • Novavax/Covovax |
| • Covaxin | |

Si recibieron una vacuna contra el COVID-19 que NO se encuentra en ninguna de las listas anteriores, deben comenzar a vacunarse contra el COVID-19 con una vacuna autorizada o aprobada por la FDA. Antes de recibir una vacuna contra el COVID-19 autorizada o aprobada por la FDA, espere al menos 28 días después de la última dosis de la no autorizada o aprobada por la FDA.

Si se vacunaron fuera de los Estados Unidos, han completado la serie primaria de vacunación sí:

- Recibió una dosis de vacuna de dosis única contra el COVID-19 (en cualquiera de las listas anteriores)
- Recibió dos dosis (o cualquier combinación aceptada) de una vacuna COVID-19 aceptada de dos dosis (incluida en cualquiera de las listas anteriores)

El CDC no recomienda mezclar diferentes vacunas contra el COVID-19 para la serie primaria, pero reconocen que esto es cada vez más frecuente en muchos países fuera de los Estados Unidos. Por lo tanto, para interpretar los registros de vacunación, las personas que recibieron una serie primaria mixta han completado la serie primaria de vacunación.

Si recibieron una vacuna COVID-19 que ESTÁ en cualquiera de las listas anteriores, pero NO completaron la serie primaria como se describe anteriormente, no tienen que comenzar la serie primaria nuevamente. Deben obtener una serie primaria de dosis (Pfizer BioNTech o Moderna). Si la 1ra dosis fue una vacuna mRNA COVID-19, lo mejor sería volver a recibir la misma vacuna para completar la serie primaria. También deben recibir una vacuna de refuerzo cuando sean elegibles.

Si recibieron una vacuna COVID-19 que ESTÁ en cualquiera de las listas anteriores y completaron la serie primaria, entonces son elegibles para la vacuna de refuerzo según las directrices anteriores.